

« J'avais l'impression d'avoir de la lave en fusion qui coulait sur ma peau... »

LEZONA S'EN MOQUE

Il s'est moqué d'elle, et il se moquera de vous.

SHINGRIX n'est pas indiqué pour le traitement du zona ou de ses complications.

Peu importe que vous vous sentiez ou non en bonne santé, votre risque de contracter le zona augmente avec l'âge.

SHINGRIX aide à protéger les adultes contre le zona. SHINGRIX peut être administré aux adultes âgés de 50 ans et plus, et aux adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement.

AIDEZ À VOUS PROTÉGER CONTRE LE ZONA AVEC



Comme c'est le cas avec tous les vaccins, une réaction immunitaire protectrice pourrait ne pas survenir chez tous les vaccinés.

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SHINGRIX vous convient. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui.

À PROPOS DU ZONA

Qu'est-ce que le virus du zona?

Le virus herpès zoster, également appelé virus du zona, est le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle.

Si vous avez eu la varicelle, ce qui est le cas de **plus de 90% des adultes canadiens**, votre système immunitaire a peut-être été en mesure de maîtriser le virus.

Toutefois, avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement. Le virus du zona peut alors être réactivé, ce qui accroît le risque de survenue du zona.

Quels sont certains des symptômes du zona?

Le zona peut entraîner des vésicules douloureuses sur la peau pouvant durer plusieurs semaines.

- La douleur provoquée par le zona peut être intense et invalidante, et peut nuire aux activités quotidiennes, y compris la marche, le sommeil et les activités sociales.
- Le zona peut aussi entraîner de graves complications, telles qu'une douleur névralgique tenace (aussi appelée névralgie postzostérienne ou NPZ), qui peut persister des mois, voire des années*.

Les autres symptômes peuvent comprendre les suivants:

- Sensation de brûlure, engourdissements ou picotements
- · Sensibilité au toucher
- Fièvre
- · Mal de tête
- Problèmes de vision
- Perte auditive

^{*} SHINGRIX n'est pas indiqué pour le traitement du zona ou de la névralgie postzostérienne.

À quoi ressemble le zona?





Êtes-vous à risque? Si vous avez déjà eu la varicelle, ce qui est le cas de plus de 90 % des adultes au Canada, vous êtes prédisposé au zona.



«Le zona me donnait des espèces de décharges électriques insoutenables... »

LEZONA S'EN MOQUE

Il s'est moqué d'elle, et il se moquera de vous.



de ses complications ou de la varicelle.

SHINGRIX

Un vaccin qui s'est avéré capable d'offrir une protection de plus de 90 % contre le zona chez les patients de 50 ans et plus

SHINGRIX est un vaccin qui aide à protéger les adultes contre le zona.

Avec l'âge, le risque de zona augmente. SHINGRIX peut être utilisé chez les adultes de 50 ans ou plus pour aider l'organisme à renforcer sa protection contre le zona.

Lors d'essais cliniques, SHINGRIX **s'est révélé efficace dans plus de 90**% des cas pour prévenir le zona chez les personnes de 50 ans ou plus. Comme n'importe quel autre vaccin, SHINGRIX pourrait ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées.

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SHINGRIX vous convient. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui.

SHINGRIX

Ce que vous devez savoir au sujet de la vaccination par SHINGRIX

- Vous recevrez deux doses de SHINGRIX, à un intervalle de deux à six mois.
- Selon votre état de santé ou les traitements planifiés, votre médecin pourrait recommander que la deuxième dose vous soit administrée un mois après la première.

Au moment où vous recevrez votre première dose, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de fixer un rendez-vous pour l'administration de votre deuxième dose.

Pour maximiser la protection conférée par SHINGRIX, il est important que vous receviez les deux doses.





SHINGRIX n'est pas indiqué pour le traitement du zona ou de ses complications.

QUI PEUT AVOIR LE ZONA?

Facteurs pouvant accroître le risque de zona

Si vous avez eu la varicelle, vous présentez un risque de contracter le zona. De plus, certains facteurs, comme les suivants, font augmenter le risque de contracter le virus.

- L'âge. Le zona est plus courant chez les personnes de 50 ans et plus.
- Les maladies qui affaiblissent le système immunitaire. L'immunosuppression associée à des affections comme le VIH/sida et le cancer peut augmenter le risque de zona.
- Les traitements immunosuppresseurs.
 La radiothérapie, la chimiothérapie, les médicaments
 immunosuppresseurs liés aux greffes et les stéroïdes
 peuvent réduire la capacité du corps à lutter contre
 les maladies, ce qui vous expose à un risque accru
 de zona.
- D'autres facteurs individuels susceptibles de vous exposer à un risque de zona peuvent être différents et variés chez des individus qui ont différents niveaux d'immunosuppression (par exemple, la maladie sous-jacente, le type, la durée et la composition du traitement).

Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien pour connaître les facteurs de risque qui peuvent vous rendre susceptible de contracter le zona.



FOIRE AUX QUESTIONS

Q: Quels sont certains des symptômes du zona?

R: Le zona peut entraîner des vésicules douloureuses sur la peau pouvant durer plusieurs semaines.

Les autres symptômes peuvent comprendre les suivants:

- Sensation de brûlure, engourdissements ou picotements
- Sensibilité au toucher
- Fièvre
- Mal de tête
- Problèmes de vision
- Perte auditive

Q: Présentez-vous un risque de contracter le zona?

R: Si vous avez déjà eu la varicelle, vous présentez un risque de contracter le zona.

Q: Le virus qui cause la varicelle est-il le même que celui qui cause le zona?

R: Oui, la varicelle et le zona sont causés par le même virus, le virus varicelle-zona.

Q: Qui devrait recevoir SHINGRIX?

- R: SHINGRIX peut être administré aux:
 - · adultes âgés de 50 ans et plus;
 - adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement.

Q: Quelle est l'efficacité de SHINGRIX?

R: Lors d'essais cliniques chez des patients âgés de 50 ans et plus, SHINGRIX s'est avéré efficace dans plus de 90 % des cas pour prévenir le zona. Comme n'importe quel autre vaccin, SHINGRIX pourrait ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées. La nécessité de doses de rappel après la primovaccination n'a pas été établie. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre médecin.

O: Combien coûte SHINGRIX?

R: Le coût de SHINGRIX varie d'une pharmacie à l'autre ou d'une clinique à l'autre. Vérifiez auprès de votre pharmacie ou de votre clinique pour connaître le prix. Certaines compagnies d'assurance privée remboursent en tout ou en partie le coût de SHINGRIX. Communiquez avec votre compagnie d'assurance pour obtenir plus d'information au sujet de votre couverture et donnez-lui le DIN (numéro d'identification du médicament) 02468425.

Q: SHINGRIX sera-t-il remboursé par les régimes provinciaux d'assurance maladie?

R: Chaque gouvernement provincial décide quels vaccins sont financés par le régime public et offerts gratuitement aux personnes admissibles. Communiquez avec les autorités de la santé publique pour en savoir plus.

Q: Peut-on avoir le zona plus d'une fois?

R: Le zona est la réactivation du virus de la varicelle, qui peut survenir plus d'une fois.

Q: SHINGRIX contient-il des virus vivants?

R: SHINGRIX est un vaccin non vivant (qui ne contient aucun virus vivant).

Q: Combien de doses de SHINGRIX sont requises pour maximiser la protection?

R: Vous recevrez deux injections de SHINGRIX, à un intervalle de deux à six mois. Selon votre état de santé ou les traitements planifiés, votre médecin pourrait recommander que la deuxième dose vous soit administrée un mois après la première. Assurez-vous de recevoir les deux doses de SHINGRIX. Cela maximisera la protection offerte par SHINGRIX.

Q: SHINGRIX peut-il protéger contre la varicelle?

R: Non, SHINGRIX est utilisé uniquement pour aider à prévenir le zona chez les adultes de 50 ans ou plus, et chez les adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement.



OUTILS À VOTRE INTENTION

Visitez SHINGRIX.ca pour obtenir d'autres ressources utiles, notamment celles qui suivent:





Détails sur le zona et SHINGRIX



Carte de rappel de vaccination à imprimer



Options de rappel de votre prochaine dose



Courriel



••• Message texte



Courriel et message texte



Ajout automatique dans votre calendrier



SHINGRIX à la télé

N'oubliez pas que pour maximiser la protection offerte par SHINGRIX, vous devrez recevoir deux doses. Apposez ces autocollants sur votre calendrier pour retenir les dates.



Trouvez-nous sur Facebook pour recevoir des mises à jour et des renseignements sur le zona et SHINGRIX. facebook.com/SHINGRIXCA

Accédez à encore plus de renseignements, d'outils et de ressources utiles en visitant SHINGRIX.ca!

Effets secondaires de SHINGRIX

Comme tout autre médicament, SHINGRIX peut causer des effets secondaires, bien que ceux-ci ne surviennent pas chez tous les patients. La majorité des effets secondaires sont jugés d'intensité légère à modérée et ne durent pas plus de 3 jours.

Les effets secondaires qui suivent sont **très courants** (cela veut dire qu'ils pourraient se manifester avec plus de 1 dose de vaccin sur 10):

Réactions au point d'injection

- Douleur
- Rougeur
- Enflure

Réactions générales

- Mal de tête
- Maux gastriques et digestifs (y compris nausées, vomissements, diarrhée ou douleur à l'estomac)
- · Douleur musculaire
- Fatique
- · Frissons, fièvre

Les effets secondaires qui suivent sont **courants** (cela veut dire qu'ils pourraient se manifester avec 1 dose de vaccin sur 10 ou moins):

- · Démangeaisons au point d'injection
- État de malaise général

Les effets secondaires qui suivent sont **peu courants** (cela veut dire qu'ils pourraient se manifester avec 1 dose de vaccin sur 100 ou moins):

Douleur articulaire (arthralgie)

Lorsque vous recevez SHINGRIX, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. En cas d'aggravation d'un de ces effets secondaires ou si vous présentez un effet secondaire qui n'est pas mentionné dans ce document, communiquez avec votre médecin.

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SHINGRIX vous convient.

SHINGRIX est un vaccin qui aide à protéger les adultes contre le zona. SHINGRIX peut être administré aux adultes âgés de 50 ans et plus, ou aux adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement. Une protection totale ne peut être garantie. SHINGRIX n'est pas indiqué pour la prévention de la varicelle ni pour le traitement du zona ou de ses complications. SHINGRIX ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique à tout ingrédient entrant dans sa composition. Des effets indésirables peuvent survenir. Les effets indésirables très courants (> 10 % des doses) signalés dans les essais cliniques ont été une douleur, une rougeur et une enflure au point d'injection, un mal de tête, des maux gastriques et digestifs, des douleurs musculaires, une fatique, des frissons et de la fièvre. La majorité des effets indésirables ont été d'intensité légère ou modérée et ont duré moins de 3 jours. Demandez à votre professionnel de la santé si SHINGRIX vous convient. On peut trouver des renseignements complets sur le produit au http://gsk.ca/shingrix/fr. Pour signaler un effet indésirable, veuillez composer le 1-800-387-7374.

Il est possible que votre régime privé d'assurance rembourse le coût de SHINGRIX. Communiquez avec votre assureur et donnez-lui le DIN (numéro d'identification du médicament) figurant ci-dessous pour le savoir. DIN DE SHINGRIX: 02468425.



Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK. © 2023 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

15070 09/23





